

甲状舌管囊肿伴甲状腺癌 1 例

郭万宏,唐建勇,何端军

(中国人民解放军第 254 医院 耳鼻咽喉科,天津 300142)

中图分类号:R653 文献标识码:D 文章编号:1007 – 1520(2015)04 – 0345 – 01

甲状舌管囊肿是甲状腺的先天发育畸形,在胚胎发育期,甲状腺由舌根盲孔区逐渐下降至出生后的甲状腺位置,下降时形成甲状舌管,如果甲状舌管未能及时闭锁退化,则可扩张形成甲状舌管囊肿。甲状舌管囊肿常常位于颈部正中舌骨与甲状腺峡部之间。甲状舌管囊肿为最常见的甲状腺发育异常,而甲状舌管囊肿伴甲状腺乳头状癌则非常罕见,将我科诊治的 1 例报道如下。

1 病例报告

患者,男,16 岁。因发现颈前肿物 3 d 入院。入院查体:颈前正中偏右侧舌骨水平处局部隆起,表面皮肤无红肿,可触及一直径约 3 cm 类圆形肿物,质地韧,边界清楚,无压痛,活动度可,可随吞咽运动上下移动。颈部彩超回报:颈下可见一 3.0 cm × 2.7 cm × 2.4 cm 大小囊性无回声区,囊壁纤细光滑,内可见点状稍强回声,压之可见液体流动感,考虑为甲状舌管囊肿;双侧甲状腺未见异常,颈部未见明显肿大淋巴结。颈部 CT 回报:颈前包块,考虑为甲状舌管囊肿。完善各项术前准备,在全麻下行甲状舌管囊肿切除术,术中见囊肿内充满淡黄色清亮液体,后壁较厚且与周围组织粘连较重,将囊肿及其周围粘连组织连同舌骨一并切除,术后病理回报:甲状舌管囊肿伴甲状腺乳头状癌,侵及囊肿壁全层(图 1、2)。拟进一步行 PET – CT 检查治疗,患者家属坚决要求出院去北京进一步治疗,后期因故失访。




图 1 甲状舌管囊肿囊壁组织 (HE × 40)




图 2 甲状腺乳头状癌组织 (HE × 400)

2 讨论

该例患者年龄较小,且术前颈部彩超回报甲状舌管囊肿、双侧甲状腺未见异常,术后病理回报合并有甲状腺癌后拟行 PET – CT 检查以确定下一步治疗,患者家属未同意,自觉有些遗憾。故对于颈部肿块的患者,术前应该尽可能行详细的检查,特别是合并有颈部淋巴结肿大者,应该考虑到甲状腺癌的可能,必要时穿刺活检或术中快速冰冻病理检查,以确定手术范围及手术方案,以追求最佳的手术治疗效果。